



АГЫТ ХҮНС ХХК



МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГ УУРЫН НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН



# ҮРИЙН БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА



### ШАР БУУРЦАГИЙН ҮР "ПУМА РП-1"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ТОСНЫ УРГАМАЛЫН ИНСТИТУТ



Ургамлын өндөр 75-95 см  
Усалгаатай талбайд тариалахыг зөвлөнө  
Боломжит ургац 36 ц/га  
Үрийн тосны агууламж 23%  
1000 үрийн жин 150 гр  
Уургийн агууламж 43%  
Шошны хүүдий 13-15см  
1 га үрийн норм 85-100 кг



### ШАР БУУРЦАГИЙН ҮР "ВИТА"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ТОСНЫ УРГАМАЛЫН ИНСТИТУТ



Эрт болцтой 70-85 хоног  
Боломжит ургац 36 ц/га  
Үрийн тосны агууламж 23%  
1000 үрийн жин 150 гр  
Уургийн агууламж 43%  
Буурцаг үүсэх хүүдий 13-15см





### ШАР БУУРЦАГИЙН ҮР "ЛИРА"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ТОСНЫ УРГАМАЛЫН  
ИНСТИТУТ



Эрт болцтой 70-85 хоног  
Боломжит ургац 32 ц/га  
Үрийн тосны агууламж 22%  
1000 үрийн жин 150 гр  
Уургийн агууламж 43%  
Буурцаг үүсэх хүүдий 13-14см



### ШАР ГИЧИЙН ҮР "ГОРЛИНКА"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ТОСНЫ УРГАМАЛЫН  
ИНСТИТУТ



Эрт болцтой 70-85 хоног  
Боломжит ургац 36 ц/га  
Үрийн тосны агууламж 50%  
1000 үрийн жин 3,7 гр  
Ногоон масс 25т/г  
Эфирын тос 0,80%  
Эруковын хүчил 0-0,5%  
Хөрсний ган болон халуунд тэсвэртэй, бүх  
тариалангийн бүс нутагт дасан зохицох чадвар  
сайтай.



### ШАР РАПСЫН ҮР "КЕНАР"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ТОСНЫ УРГАМАЛЫН  
ИНСТИТУТ



Эрт болцтой 70-85 хоног  
1000 үрийн жин 2.9-4.1гр  
Тослогын агууламж 50%  
Уургийн агууламж 26%  
Ногоон массын ургац 28тн/га



### ВАНДУЙН ҮР "НАРАТ"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН КАЗАН ДАХЬ ШИНЖЛЭХ  
УХААНЫ ТӨВИЙН ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН  
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭН



Хүнсний болон тэжээлийн зориулалттай  
Дунд эртийн болцтой 68-85 хоног  
Боломжит ургац 2,3 тн/га  
1000 үрийн жин 185-262 гр  
Ургамалын өндөр 54-89 см  
Уургийн агууламж 26%-дээш





### ШАР БУУРЦАГИЙН ҮР "СК ДОКА"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН СОКО КОМПАНИ



Бүс нутгийн цаг уурын онцлогийг харгалцан ОХУ-д үржүүлсэн хэт эрт сортууд нь ургах хугацаа богиноссон тул Монгол Улсад тариалахад тохиромжтой.

Эрт болцтой 70-85 хоног

Боломжит ургац 30 ц/га

Уургийн агууламж 41%

Үрийн тосны агууламж 24%

1000 үрийн жин 150 гр

Малын тэжээлийн зориулалтаар буурцагт ургамалтай хольж тариалах боломжит үр



### ШАР БУУРЦАГИЙН ҮР "СК АРТИКА"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН СОКО КОМПАНИ



Эртийн болцтой 78-83 хоног

Уураг 41-43

Үрийн тосны агууламж 21-23

1000 үрийн жин 150-160 гр

Ургамалын өндөр 70-80 см



### ОВЪЁОСНЫ ҮР "КОНКУР"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН "НЕМЧИНОВКА"  
ХОЛБООНЫ СУДАЛГААНЫ ТӨВ



Сортыг Ульяновск хотын Хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран "Эрдэм шинжилгээний төв үйлдвэрийн газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн" (овъёос селекцийн лаборатори) улсын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд бий болгосон. Женевт болсон олон улсын үзэсгэлэнгээс мөнгөн медаль, дипломоор шагнуулсан.  
Эрт болцтой 70-85 хоног  
Боломжит ургац 4.55- 6.23 ц/га  
Уургийн агууламж 9.7-12.4 %  
1000 үрийн жин 34.5-41 гр  
Ганд тэсвэртэй



### СУДАН СОРГО ЭРЛИЙЗЖҮҮЛСЭН ҮР "САБАНТУЙ"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ШИНЖЛЭХ УХААН,  
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН КОМПАНИ  
"НИКАС"



Иш нь шүүслэг, дунд зэргийн бутлаг.

Ургамлын өндөр 250-280 см

Ногоон масс нь 9-13% Уураг, 13% элсэн чихэр, агуулдаг 100 кг ногоон масс 21 тэжээлийн нэгжтэй тэнцэнэ.

Хадгалах хамгийн оновчтой хугацаа нь гуурсан хоолой үүсэх үе шатанд 40-45 хоногт дарш бэлдэнэ.



### ЭРДЭНЭШИШИЙН ҮР "130МВ"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН П.П. ЛУКЬЯНЕНКОГИЙН  
НЭРЭМЖИТ КРАСНОДАРИЙН СУДАЛГААНЫ  
ХҮРЭЭЛЭН



Соёлолтоос боловсорч гүйцсэн хугацаа 94-95  
хоног

Боломжит ургац 80-87 ц/га

Даршны ногоон массын ургац 442 ц/га

1000 үрийн жин 260-270 гр

Ургамалын өндөр 170-210 см

Үр авах, даршлах зорилгоор тариалах боломжтой,  
Хүйтэн, өвчинд тэсвэртэй



### ЭРДЭНЭШИШИЙН ҮР "194МВ"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН П.П. ЛУКЬЯНЕНКОГИЙН  
НЭРЭМЖИТ КРАСНОДАРИЙН СУДАЛГААНЫ  
ХҮРЭЭЛЭН



Соёлолтоос боловсорч гүйцсэн хугацаа 97-98  
хоног

Боломжит ургац 94-110 ц/га

Даршны ногоон массын ургац 694 ц/га

1000 үрийн жин 250-270 гр

Ургамалын өндөр 240-260 см

Үр авах, даршлах зорилгоор тариалах боломжтой,  
Хүйтэн, ишний ялзралд тэсвэртэй





## ГИШНИЙ ҮР "ВИКА"



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОХУ-ЫН ЛЬГОВСКИЙН  
ТУРШИЛТЫН ҮРЖЛИЙН СТАНЦ



Соёлолтоос эхлээд тэжээлийн зориулалтаар  
хураах хүртэлх ургамлын хугацаа 38-45 хоног,  
үрийн хувьд 82-102 хоног байна.Боломжит ургац  
94-110 ц/га

Даршны ногоон массын ургац авахын тулд Конкур  
сортын овъёос болон вандуй, улаан буудайтай  
хольж тариалах боломжтой. Шинжлэх ухааны  
үндэслэлтэй үрийн холимог санал болгож байна.

1000 үрийн жин 72-73 гр

Уургийн агууламж 16.4%

Ургамалын өндөр 71-81 см

### ТЭЖЭЭЛИЙН ТАРИМЛЫН ХОЛЬЦ 1

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Гиш овъёосны хольц (RS-1) | 20x80 |
| Гиш-овъёосны хольц (RS-1) | 30x70 |
| Гиш-овъёосны хольц (RS-1) | 40x60 |
| Гиш-овъёосны хольц (RS-1) | 50x50 |

### ТЭЖЭЭЛИЙН ТАРИМЛЫН ХОЛЬЦ 2

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Вандуй-царгас-овъёосны холимог     | 15x15x70    |
| Вандуй-царгас-овъёосны холимог     | 20x20x60    |
| Вандуй царгас овъёос холимог       | 25x25x50    |
| Гиш-овъёос-арвай-буудайны холимог  | 20x30x25x25 |
| Гиш -овъёос-арвай-буудайны холимог | 30x30x20x20 |
| Гиш-овъёос-арвай-буудайны холимог  | 40x30x15x15 |
| Гиш-овъёос-арвай-буудайны холимог  | 50x20x15x15 |





## СОРГО



ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: ОРОСЫН ХОЛБООНЫ  
УЛСЫН ТӨСВИЙН ШИНЖЛЭХ  
УХААНЫ БАЙГУУЛЛАГА "ОХУ-ЫН  
ШУА-ИЙН АГРОЭКОЛОГИ, ИЖ БҮРЭН  
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН  
ОЙЖУУЛАЛТЫН ХОЛБООНЫ  
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨВ"

Мал аж ахуй бол хөдөө аж ахуйн маш нарийн төвөгтэй салбар бөгөөд зардлын бүтцэд олон бүрэлдэхүүн хэсэг багтдаг. Уламжлал ёсоор тэжээл нь зардлын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Тэжээлийн хангамжийг зохион байгуулах тогтолцоо, таримлын төрлөөс хамааран тэдгээр нь үйлдвэрлэлийн нэгжид ногдох бүх зардлын 60-70 хүртэлх хувийг эзэлдэг. Энэ нь тэжээлийн зардлыг хэмнэх боломжийг олох чухал нөөц юм.

Дээр дурдсан зүйлсийг харгалзан ургамлын гаралтай хямд тэжээлийг олж авах гол арга бол тэдгээрийг тариалахад хамгийн бага зардлаар нэг га-аас хамгийн их ургац авах явдал юм. Цаг агаарын хамгийн хүнд нөхцөлд маш сайн чанарын ногоон массыг их хэмжээгээр өгдөг ирээдүйтэй ургац бол амтат сорго юм. Биологийн хувьд ижил төрлийн тэжээлийн тарималтай харьцуулахад сорго ямар давуу талтай вэ? Тус ургамал нь ганд тэсвэртэй тэжээлийн гол ургац болох даршны эрдэнэ шишээс илүү бөгөөд эрдэнэ шиш нь өндөр ургацыг зөвхөн хангалттай чийгшилтэй үед л авах боломжтой. Жишээлбэл, сорго нь хуурай бодисын нэгжид ердөө 300 хэсэг ус хэрэглэдэг. Харьцуулбал, Суданы өвс 340, эрдэнэ шиш 388, улаан буудай 515 байна.

Сорго нь 7-р сарын эхнээс 8-р сарын сүүл хүртэл ногоон масс үүсгэдэг бөгөөд ургацын хувьд бусад үр тарианаас илүү байдаг. Хадсаны дараа сорго хурдан ургаж, намрын сүүл хүртэл ургадаг ба дахин ургац авах боломжтой.

Ногоонмасс, үр тариаг бүх төрлийн фермийн малд тэжээхэд тохиромжтой. Сорго нь зөвхөн өндөр ургацтай тариалан төдийгүй малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нүүрс ус, уураг, каротин, таннин, витаминаар баялаг юм. Шим тэжээлийн шинж чанарын хувьд соргоны ногоон масс нь эрдэнэ шиштэй бараг тэнцэхүйц сайн бөгөөд зарим бүс нутагт түүнээс ч давж ургадаг. Тэжээлийн тарианаас гадна архи, цардуулын үйлдвэрт соргог хэрэглэдэг. Амтат сорго, судан өвс нь буурцагт ургамлууд, эрдэнэ шиш, наранцэцэгтэй хольж тариалах нь илүү үр дүнтэй нь нотлогдсон. Элсэн чихэрээр баялаг шүүслэг иш нь дарш, хадлангийн тэнцвэртэй байдлыг хангадаг ба тариалангийн бүтээмж маш өндөр байна.





ГАЗАРТАРИАЛАН,ХУДАЛДААҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

**“АГЬТ ХҮНС” ХХК**

НАРТ, IV БАГ, БОРНУУР СУМ, ТӨВ АЙМАГ

УТАС: (976) 8058 8848

ЦАХИМ ШУУДАН: Agit.khuns88@gmail.com

Манай компани малын тэжээлийн шинэ төрлийн таримлыг сэлгээнд нэвтрүүлэх зорилгоор ОХУ-ын ЭШХ-ээс гаргасан Монгол Улсын цаг уурын нөхцөлд тохирсон үрийн бөөний худалдаа, үр тариа, буурцагт ургамал, тэжээл, тосны ургамал, нэг болон олон наст өвсний олон төрлийн үрийг санал болгож байна.

Мөн тэжээл бэлтгэх орчин үеийн савлагааны материал, даршны био идэвхжүүлэгч нийлүүлнэ.